

STANOWISKO Nr 5
FORUM NAUKOWEGO COVID-19
NACZELNEJ IZBY LEKARSKIEJ

z dnia 21 czerwca 2021 r.

**w sprawie możliwości kontynuacji schematu szczepień przeciwko COVID-19
preparatem innej firmy**

Zgodnie z CHPL szczepionki przeciwko COVID-19 firmy AstraZeneca oraz bieżącym doświadczeniem klinicznym, jeśli po podaniu 1-szej dawki szczepionki w ciągu 30 dni wystąpił poważny odczyn poszczepienny, definiowany jako niezamierzone i niepożądane zdarzenie lub stan pogorszenia zdrowia, zaistniały podczas lub po interwencji medycznej, należy wstrzymać podanie 2-giej dawki tego preparatu.

Jedna dawka szczepionki AstraZeneca nie chroni przed zakażeniem COVID w dostatecznym stopniu.

Aktualne publikacje wskazują na możliwość kontynuacji rozpoczętego preparatem AstraZeneca schematu szczepień, preparatem Pfizer/BioNtech, co jest skuteczne i bezpieczne.

Kontynuacja rozpoczętego cyklu szczepień preparatem Pfizer, w trybie off-label, wymaga zgody pacjenta i lekarza.

Termin podania 2-giej dawki powinien zmieścić się w 12 tygodniach od podania pierwszej dawki.

Powyższe postępowanie jest niestandardowe, dlatego proponuje się ocenę stężenia przeciwciał poszczepiennych 4-6 tyg. po podaniu dawki szczepionki Pfizer.

Przewodniczący Forum



Prof. dr hab. med. Andrzej Matyja